

Infodienst Wildtiere

Ausgabe 1/2024 (Bayern-Spezial) vom 4. März 2024

Nachtjagdtechnik – zweifelhafter Nutzen für den Tier- und Naturschutz

Bezugnehmend auf ein am 22. Februar auf pirsch.de veröffentlichtes Interview mit Hubert Aiwanger hält der Jagdminister die Zeit für die Bejagung von Fuchs & Co und von als invasiv eingestuften Säugetierarten mittels Nachtsicht- bzw. Wärmebildtechnik (im folgenden „Nachtjagdtechnik“) für reif.¹

Diese Einstellung betrachten wir sowohl aus der Sicht des Tier- wie auch des Naturschutzes als kritisch bzw. nicht zielführend und nehmen dazu wie folgt Stellung:

- Fuchs und Waschbär werden in Bayern schon heute intensiv bejagt. Ansitz- oder Pirschjagd spielen zumindest bei den als invasiv bezeichneten Säugetierarten – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle. Die Jagd auf diese Tierarten erfolgt vornehmlich mittels der Fallenjagd. **Die Zulassung von Nachtjagdtechnik hätte daher von vornherein bei den genannten Tierarten nur geringe Effekte.**
- Darüber hinaus kann man zumindest vom Fuchs aufgrund der Jagdstrecken, die bei einer intensiv bejagten Art immer ein gutes Indiz für die Bestände sind, schließen, dass diese Tierart in Bayern ohnehin an ihrer Kapazitätsgrenze lebt. Eine weitere Intensivierung der Jagd durch Nachtjagdtechnik kann aufgrund der Populationsdynamik dieser Tierart **keine nachhaltige Reduzierung des Bestands** bewirken. Zahlreiche Studien zur Populationsdynamik des Rotfuchses zeigen auf, dass die Bejagung zu keinerlei Bestandsreduktion führt, sondern lediglich zu einer Verschiebung im

Altersklassenaufbau mit einem deutlich höheren Anteil an Jungtieren und trächtigen Fähen gegenüber unbejagten Populationen.² Dass eine solche Situation zu **mehr Tierleid** führt, ist nachvollziehbar.

- Hinzu kommt, dass schon heute in Bayern ganzjährig die Möglichkeit besteht, Wildtiere zu bejagen und damit selbst in Natura 2000-Gebieten erheblich zu beunruhigen. Beim Schwarzwild, welches ohne Schonzeiten ganzjährig bejagt wird, ist die Verwendung von Nachtjagdtechnik bereits seit 2020 in den meisten Bundesländern zulässig. Eine belastbare Evaluation des bisherigen Einsatzes dieser Technik wurde unseres Wissens bisher in keinem Bundesland durchgeführt. Auch sind entsprechende Bewertungen aus Baden-Württemberg (2020) oder Niedersachsen (2022), wo Nachtjagdtechnik auch für die Jagd auf Füchse, Nutria oder Waschbären erlaubt ist, nicht bekannt. Der Einsatz von Nachtjagdtechnik beruht also allein auf Annahmen, der **Nutzen ist bisher nicht belegt und wurde nicht wissenschaftlich geprüft.**
- Des Weiteren haben wir in Deutschland bereits heute die längsten Jagdzeiten für Schalenwild in Europa. Die Resultate im Hinblick auf eine nachhaltige Reduzierung von Wildtierarten sind marginal, weil mehr Jagd, insbesondere an der Kapazitätsgrenze einer Tierart nicht zielführend ist.³ Eine weitere Öffnung der Jagd zur Nachtzeit hin nimmt den Wildtieren – gerade auch den nicht jagdbaren und zum Teil streng geschützten Tierarten – einen letzten Hort des Rückzugs.

¹ Aiwanger zu einer Jagdgesetzänderung in pirsch.de: <https://www.pirsch.de/news/hubert-aiwanger-im-interview-kommt-eine-jagdgesetz-aenderung-38468>

² Frommhold (2018): Kurzzusammenfassung wissenschaftlicher Literatur zum Rotfuchs: Abrufbar unter <https://www.wildtierschutz->

[deutschland.de/_files/ugd/173a38_fa85776330d84f3aa9bcb32fb5f04192.pdf?index=true](https://www.wildtierschutz-deutschland.de/_files/ugd/173a38_fa85776330d84f3aa9bcb32fb5f04192.pdf?index=true)

³ REICHHOLF, J. (2013): Jagd reguliert nicht - Vortrag <https://www.youtube.com/watch?v=vOAUfU4IHbQ>

- **Durch den nochmals steigenden Jagddruck steigt die Stressbelastung der Wildtiere⁴** und damit vergrößern sich einhergehende Probleme wie Anfälligkeit für Krankheiten, Pflanzenverbiss, Ausfall oder Aufgabe von Brutnesten störungsanfälliger Vogelarten. Bei Reh- und Rotwild wurden stressbedingte Auswirkungen auf die Populationsdynamik belegt. Studien belegen zudem für das Rotwild, dass Stressbelastung zu mehr weiblichen Geburten führt.⁵
- Ganz unabhängig davon konnte durch die Bejagung von Waschbären bis dato **für den Naturschutz, insbesondere für die Biodiversität, kein Nutzen nachgewiesen werden**. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein: Bestandverluste an der Lebensraumkapazitätsgrenze sind Auslöser für eine erhöhte Reproduktion. Der Nahrungsbedarf der bejagten Tierart und damit die Zahl der Konflikte dürfte durch die intensive Bejagung eher zunehmen.
- Auch die EU-Verordnung zu den invasiven Arten (Verordnung (EU) Nr. 1143/2014) ist kein Freibrief für die Bejagung der Waschbären und anderen, als invasiv eingestuften Arten. Ganz im Gegenteil: Die Jagd kann gar keine Maßnahme im Sinne der Verordnung sein, solange sie sich nicht auch den sonstigen Regeln der Verordnung unterwirft. Die EU fordert beispielsweise, dass zunächst die Schäden der invasiven Arten und der Nutzen der Maßnahmen gegeneinander abgewogen werden müssen. Sie fordert, dass Maßnahmen "verhältnismäßig", das heißt angemessen sein müssen. Und letztlich **fordert die Verordnung, dass die Wirksamkeit von Maßnahmen ganz konkret nachgewiesen werden muss**. Das bedeutet nicht weniger, als dass man anstatt auch noch die Nacht mittels Technik zum Tage zu machen, die Jagdzeiten für Waschbären und andere invasive Arten vernünftigerweise komplett streicht und stattdessen gezielt dort über **lokale Maßnahmen** nachdenkt, **wo es tatsächlich ein erhebliches Konfliktpotential mit den Zielen des Naturschutzes gibt**. Dabei sollten auch nicht-letale Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Eine Tötung kann immer nur Ultima Ratio sein.
- Aus Gründen der Weidgerechtigkeit kann Nachtjagdtechnik auch ohnehin kein Ersatz für das Ansprechen von Tieren unter geeigneten Sichtverhältnissen sein. Ihre Verwendung **ermutigt Jäger dazu, hochriskante Schüsse abzugeben**, durch die Wildtiere nur verletzt, aber nicht sofort getötet werden. Das dadurch verursachte Leid wird noch dadurch verstärkt, dass zur Nachtzeit eine Nachsuche i.d.R. nicht erfolgen kann und – wenn überhaupt – frühestens am nächsten Morgen durchgeführt wird, was aber **nicht gesetzeskonform** ist. Zudem erhöht sich die Gefahr von Fehlabschüssen, d. h. von Abschüssen der falschen Tierart. Auch mit einer guten Wärmebildkamera ist die Bestimmung von Tieren deutlich schwieriger als unter natürlichem Licht.
- Es stellt sich ferner die Frage, wie die Technisierung der Jagd unter ethischen Gesichtspunkten und damit auch hinsichtlich der Weidgerechtigkeit zu beurteilen ist. Wer diese Technik befürwortet, sollte sich auch die Frage stellen, ob diese Art der Bejagung noch weidgerecht und damit auch tierschutzgerecht ist. Die Grundsätze der Weidgerechtigkeit verlangen auch, dem Wild die größtmögliche Chance zu lassen. Dies erscheint bei einer hohen Technisierung zweifelhaft. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist darüber hinaus auch durch entsprechende Studien nicht belastbar belegt. **Damit entbehrt die Nachtjagdtechnik auch jeglicher jagdlichen Ethik**.
- Schließlich entzieht sich durch den Einsatz von Nachtjagdtechnik die Jagd noch weiter der öffentlichen Beobachtung. Jagdvergehen werden

⁴ VILELA, S. et al.: Physiological Stress Reactions in Red Deer Induced by Hunting Activities (2020) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7341308>

⁵ Wildtiere und Stress, in PIRSCH (2022), <https://www.pirsch.de/jagdwissen/wildbiologie/wildtiere-und-stress-welche-auswirkungen-gibt-es-36317>

dadurch noch schwerer entdeckt und dokumentierbar. Letztlich können Jäger dadurch noch uneingeschränkter und unkontrollierter schalten und walten als bisher schon. Dass die jagdliche Selbstkontrolle und die Sanktionierung durch die Jagdorgane nicht funktioniert, dürfte Fakt sein.

Ausführungen zur Fuchsjagd

In Bayern wie in anderen Bundesländern gibt es unseres Wissens weder auf Landes- noch auf Kreisebene valide belastbare Daten, die überhaupt einen ökologischen Nutzen der Fuchsjagd z.B. hinsichtlich der im Bestand gefährdeten jagdbaren Arten oder auch bezüglich der nicht dem Jagdrecht zugeordneten Bodenbrüter belegen. Ein Blick in die Jagdstatistiken zeigt, dass nicht einmal Rebhuhn (Rote Liste) oder Fasan von der seit jeher intensiven Jagd auf Fuchs & Co. profitieren. Die Zahl der Rehhühner ist zwischen 2003 und 2013 um etwa 60 Prozent zurückgegangen, in den letzten 10 Jahren ist die Streckenliste auf niedrigem Niveau in Bayern um weitere 70 Prozent eingebrochen. Bei den in der Streckenstatistik bayernweit gerade noch 625 ausgewiesenen Rebhühnern dürfte es sich fast ausschließlich um Fallwild handeln, was demnach ein verlässlicher Indikator für die negative Bestandsentwicklung ist.

Auch die seitens der Jägerschaft und von zuständigen Ministerien immer wieder vorgebrachten Argumente hinsichtlich einer „Seuchen“-prävention oder einer Bestandsregulierung laufen ins Leere. Dort wo Fuchsbestände in deutschen Nationalparks, im Kanton Genf oder in Luxemburg teilweise seit Jahrzehnten nicht bejagt werden, gibt es weder Auffälligkeiten noch belastbare Hinweise auf negative Auswirkungen hinsichtlich diverser Krankheitsbilder (Räude, Staupe) noch hinsichtlich

des Befalls durch den Fuchsbandwurm. Auch ist es in keinem der genannten Fuchsjagd freien Areale zu einer wie auch immer gearteten „Überpopulation“ gekommen.

Auf der anderen Seite weisen verschiedene Studien darauf hin, dass gerade durch eine intensive Jagd auf Füchse Krankheiten und Bandwurmbefall tendenziell zunehmen.^{6 | 7} Grund dafür ist, dass durch die intensive Jagd letztlich mehr und jüngere, mit geringeren Resistenzen ausgestattete Füchse (Kompensation der Bestandsverluste durch erhöhte Reproduktion, Reduzierung des Durchschnittsalters der Bestände) auf der Reviersuche sind und dadurch das Verbreitungspotential für Krankheiten oder den Fuchsbandwurm steigt. Das Paradebeispiel für eine völlig sinnfreie Bejagung der Füchse ist die missglückte Tollwutbekämpfung. Erst der Einsatz von großräumig gestreuten Impfködern hat die terrestrische Tollwut in Deutschland und weiten Teilen Europas ausgelöscht.

Wenn doch über Jahrzehnte die intensive Fuchsjagd der Entwicklung von Beständen gefährdeter jagdbarer Arten nicht zuträglich war und es aus Jahrzehnten der Erfahrung mit der Fuchsjagd international (!) **nicht einen belastbaren wissenschaftlichen Beleg für den ökologischen Nutzen der Jagd** auf Füchse gibt, Dutzende von Studien die Unwirksamkeit der jagdlichen Maßnahmen belegen, muss das Ziel der Freigabe von Nachtjagdtechnik in Frage gestellt werden.⁸

⁶ Debbie, J. (1991): Rabies control of terrestrial wildlife by population reduction. In: Baer, G.M. (Ed.), The natural History of Rabies. CRC Press, Boca Raton.
Kaphegyi, T.A. (2002): Untersuchungen zum Sozialverhalten des Rotfuchses (*Vulpes vulpes* L.). Dissertation, Forstwissenschaftliche Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Brsg, Freiburg im Breisgau

⁷ Comte, S. et al (2017): *Echinococcus multilocularis* management by fox culling: An inappropriate paradigm, Preventive Veterinary Medicine, Volume 147, 178-185. Abruflbar unter: http://www.e-l-i-z.com/doc_word/ECHINO/COMTE-2017-publi-Em_Nancy-prevetmed.pdf

⁸ Frommhold (2018): FN 2